

Применение Карипаина



для лечения межпозвонковых грыж,
остеохондроза и заболеваний суставов

Л.И. Покотило,
к.м.н., директор клиники
«Семейный врач и СО»

Как известно, существует два подхода к лечению межпозвонковых грыж – хирургический и консервативный. И каждый из них имеет свои недостатки: оперативное лечение инвазивно, а консервативное дает лишь кратковременный эффект.

За последние пять лет разработан и успешно применяется новый неоперативный метод патогенетического лечения, который гарантирует устранение причины заболевания, а не только его следствия. Речь идет о лечении ферментными препаратами, содержащими протеолитический фермент Папаин со вспомогательной группой активных веществ. Данный метод очень эффективен как при хроническом течении болезни, так и в начальной ее стадии.

Методики лечения были разработаны и применяются в известных научно-практических организациях: Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова (ЦИТО), Научно-исследовательский институт Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.

На основе этих методик и фармакологических исследований были разработаны сухие бальзамы (лиофилизаты) «Карипайн» (флакон 1 г), «Карипайн Плюс» (флакон 1 г) и мягкие формы выпуска – крем «Карипайн» (туба 50 мл) и гель «Карипайн Ультра» (туба 30 мл). Это ферментные препараты нового поколения, не имеющие полных аналогов.

Вся серия препаратов «Карипайн» предназначена для комплексного лечения и профилактики заболеваний позвоночника и суставов. Эффективность применения Карипаина оценивается величиной не менее 75%. Карипайн успешно прошел все клинические испытания в России и за рубежом, сертифицирован в России, СНГ и странах Европейского союза.

В состав крема «Карипайн» и геля «Карипайн Ультра» входят биологически активные вещества растительного и животного происхождения (Папаин, Глюкозамин, Хондроитина сульфат, Гиалуроновая кислота, Босвелиевые кислоты и др.). В состав сухих бальзамов «Карипайн» входят Папаин, Лизоцим, Бромелайн и др. Все эти активные вещества положительно влияют на коллагеновые хрящевые ткани позвоночника и суставов. Благодаря определенной концентрации папаина, Карипайн, вводимый методами электрофореза (бальзамы), фенофореза или путем местного применения (гель или крем), влияет на межпозвонковую грыжу. Грыжа начинает постепенно уменьшаться, становится мягкой. Этого достаточно, чтобы освободить нервное окончание, которое она защемляет, и боли в позвоночнике постепенно проходят.

Карипайн также положительно действует на весь межпозвонковый диск. Он становится более эластичным и «упругим», увеличивает свою высоту. Под действием Карипаина усиливается регенерация тканей диска. Вводимый Карипайн воздействует на несколько соседних межпозвонковых дисков, восстанавливая целый отдел позвоночника.

Карипайн бальзам и крем рекомендуется регулярно применять при остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, артрите, артрозе, суставных контрактурах и других заболеваниях позвоночника и суставов.

Подробные методики применения и полные описания различных форм выпуска Карипаина изложены на сайтах производителя www.karipain.org и www.caripain.ru.

В настоящее время лечение Карипаином проводится более чем в 250 клиниках в 55 регионах России.

Карипайн продается только в аптеках, приобрести его можно в любой крупной аптеке России и стран СНГ.

Компания «ПромАктив», тел.: +7(495)589-33-48, 543-64-30

эл. почта: karipain@rambler.ru
www.karipain.org, www.caripain.ru